

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



CM 2530

(11)

EP 1 010 419 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
21.06.2000 Patentblatt 2000/25(51) Int. Cl.⁷: A61K 7/13

(21) Anmeldenummer: 99120500.6

(22) Anmeldetag: 15.10.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 15.12.1998 DE 19857847

(71) Anmelder:


Wella Aktiengesellschaft
64274 Darmstadt (DE)

(72) Erfinder:

- Göttel, Otto, Dr.
1723 Marty (CH)
- Mettler, Sandra
1723 Marty (CH)
- Hayoz, André
1724 Senèdes (CH)
- Pirrello, Aline
1762 Glivisiez (CH)

(54) Mittel enthaltend 1,3-Indandionen und aromatischen Aminen zum Färben von Fasern

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mittel zum Färben von Fasern, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß es (a) mindestens ein 1,3-Indandion der allgemeinen Formel (I) und (b) mindestens ein aromatisches Amin enthält,



(I),

falls mit einem Halogenatom, einer Hydroxygruppe, einer Methoxygruppe oder einer Ethoxygruppe substituiertes ankondensiertes benzoaromatisches System oder ein ankondensiertes naphthoaromatisches System bilden; oder R2 und R3 eine 1,3-Dioxo-propan-1,3-diyl-Gruppe darstellen; sowie ein Verfahren zum Färben von Fasern.

wobei die Reste R₁, R₂, R₃ und R₄ untereinander gleich oder verschieden sein können und die folgende Bedeutung haben:

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Acetylaminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Acetoxygruppe, eine Methylgruppe oder Ethylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, eine Benzylalkoxygruppe, die gegebenenfalls durch eine Methylgruppe, eine Methoxygruppe oder ein Halogenatom substituiert sein kann, ein über eine Etherbrücke verknüpfter C2-bis C8-Mono-Olefinrest oder Di-Olefinrest, ein 1,3-Indandion-5-yl-Rest, eine Phenylgruppe, eine Carbonsäuregruppe, eine Carbamidgruppe, eine C1- bis C7-Carbonsäureestergruppe oder eine Phenoxypropoxygruppe; R₁ und R₂ beziehungsweise R₂ und R₃ gemeinsam eine C5- bis C6-Alkylengruppe, eine 1,3-Dioxolbrücke, eine 1,4-Dioxinbrücke, ein gegebenen-

EP 1 010 419 A2

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung sind Färbemittel mit einem Gehalt an 1,3-Indandionen und aromatischen Aminen.

[0002] Auf dem Haarfarbsektor besteht nach wie vor ein steigender Bedarf nach kastanienbraunen und kupferfarbigen bis roten Nuancen.

Diese Nachfrage kann beispielsweise durch die Bereitstellung von Oxidationshaarfärbemitteln auf der Basis von bestimmten Entwicklersubstanzen, wie zum Beispiel p-Aminophenol-Derivaten, mit bestimmten Kupplersubstanzen, wie zum Beispiel m-Aminophenol- oder m-Phenyldiamin-Derivaten, befriedigt werden (permanente Färbung). Mit den genannten Oxidationsfärbemitteln lassen sich sehr intensive Färbungen bei guten Echtheitseigenschaften erreichen. Bisweilen kann es allerdings bei empfindlichen Personen zu Unverträglichkeiten gegen bestimmte Oxidationsfarbstoff-Vorstufen kommen. Ein weiterer Nachteil des permanenten Färbesystems liegt darin, daß vor allem bei häufiger Anwendung eine deutliche Verschlechterung des Haarzustandes eintritt, was unter anderem auch durch die verwendeten Oxidationsmittel und/oder der Kombination aus Ammoniak und Peroxiden zurückzuführen ist. Steht neben der Farbgebung noch der Wunsch nach milden Färbebedingungen im Vordergrund, so findet man im Markt neben Nischenprodukten, die zum Teil nur auf bestimmte Haartypen anwendbar sind und unter Umständen häufiger angewendet werden müssen, vor allem die Tönungen, die auf direktziehenden Farbstoffen aufgebaut sind.


[0003] Das Farbergebnis, das durch Tönungen erzielt werden kann, wird im Laufe der Zeit graduell schwächer, da die Farbstoffe vor allem an der Haaroberfläche adsorbiert sind und durch Shampooieren der Haare ausgewaschen werden. Darüber hinaus können wegen physiologischer Bedenken verschiedene direktziehende Farbstoffe, wenn überhaupt, nur in eingeschränktem Maße eingesetzt werden.

[0004] Da es mit konventionellen Färbemethoden in der Regel nicht möglich ist, unter milden Färbebedingungen sehr dauerhafte Färbungen im Naturtonbereich sowie in modischen Rottönen zu erzielen, bestand weiterhin ein großer Bedarf nach einem Färbesystem, welches eine haarschonende und gleichzeitig dauerhafte Färbung ermöglicht.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ohne die Nachteile der etablierten Färbeverfahren Keratinfasern, insbesondere menschliche Haare, auf eine schonende und dauerhafte Weise zu färben, wobei das Färbemittel hinsichtlich seiner Farbtintensität mit oxidativen Färbemitteln vergleichbar sein soll. Hierbei soll das Färbemittel auch ohne die Verwendung von Ammoniak/Peroxid- bzw. Ethanolamin/Peroxid-Kombinationen eingesetzt werden können.

[0006] Es wurde nun gefunden, daß eine Kombination aus 1,3-Indandionen und aromatischen Aminen enthaltende Färbemittel die gestellten Anforderungen in hervorragender Weise erfüllen und auch ohne den Zusatz von Oxidationsmitteln bei hautneutralen pH-Werten Färbungen mit hervorragenden Echtheitseigenschaften und einer hohen Farbbrillanz ermöglichen.

[0007] Gegenstand der Erfindung sind daher Mittel zum Färben von Fasern, insbesondere Keratinfasern, wie zum Beispiel menschlichen Haaren, welche dadurch gekennzeichnet sind, daß sie (a) mindestens ein 1,3-Indandion der allgemeinen Formel (I) und (b) mindestens ein aromatisches Amin enthalten



(I),

wobei die Reste R_1 , R_2 , R_3 und R_4 untereinander gleich oder verschieden sein können und die folgende Bedeutung haben:

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Acetylaminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Acetoxygruppe, eine Methylgruppe oder Ethylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, eine Benzyloxygruppe, die gegebenenfalls durch eine Methylgruppe, eine Methoxygruppe oder ein Halogenatom substituiert sein kann, ein über eine Etherbrücke verknüpfter C2- bis C8-Mono-Olefinrest oder Di-Olefinrest, ein 1,3-Indandion-5-yl-Rest, eine Phenylgruppe, eine Carbonsäuregruppe, eine Carbamidgruppe, eine C1- bis C7-Carbonsäureestergruppe oder eine Phenoxypropoxygruppe; R_1 und R_2 beziehungsweise R_2 und R_3 gemeinsam eine C5- bis C6-Alkylengruppe, eine 1,3-Dioxolbrücke, eine 1,4-Dioxinbrücke, ein gegebenenfalls mit einem Halogenatom, einer Hydroxygruppe, einer Methoxygruppe oder einer Ethoxygruppe substituiertes ankondensiertes benzoaromatisches System oder ein ankondensiertes naphthoaromatisches System bilden; oder R_2 und R_3 gemeinsam eine

1,3-Dioxo-propan-1,3-diyl-Gruppe bilden.

[0008] Bevorzugte Verbindungen gemäß der allgemeinen Formel (I) sind Verbindungen, in denen die Reste R_1 , R_2 , R_3 und R_4 unabhängig voneinander die folgende Bedeutung haben:

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Methylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, eine Benzylalkoxygruppe, die gegebenenfalls durch eine Methylgruppe oder eine Methoxygruppe substituiert sein kann oder eine Carbamidgruppe; R_1 und R_2 beziehungsweise R_2 und R_3 gemeinsam eine 1,3-Dioxolbrücke oder eine 1,4-Dioxinbrücke bilden.


[0009] Besonders bevorzugte Verbindungen sind das 1,3-Indandion, das 4-Nitro-1,3-indandion, das 5-Nitro-1,3-indandion, das 5,6-Dichlor-1,3-Indandion und das 4,5,6,7-Tetrachlor-1,3-Indandion.

[0010] Die erfindungsgemäßen Mittel färben Fasern, insbesondere Haare, in hellblonden bis braunschwarzen sowie rotbraunen Farbtönen, wobei auch farbintensive Naturtöne mit brillanten Reflexen möglich sind.

[0011] Die 1,3-Indandione gemäß der Formel (I) sind nach aus der Literatur bekannten Herstellungsverfahren herstellbar; zudem ist ein Teil der Verbindungen der Formel (I) im Handel erhältlich. Hierbei sei insbesondere auf die Herstellung der 1,3-Indandione aus den entsprechenden Phthalsäureanhydriden gemäß der Literatur Wanag und Oschkaja, Zhur. obsc. Chim. 28, 1520 [1958] (englische Ausgabe: Journal of General Chemistry of the U.S.S.R. 28, 1570 [1958]) und der dort genannten weiterführenden Literatur verwiesen.

[0012] Als aromatischen Amine, die in dem erfindungsgemäßen Färbemittel zum Einsatz kommen, sind insbesondere p-Phenylendiamin-Derivate und p-Aminophenol-Derivate, Pyridine, Pyrimidine und Pyrazole, wie zum Beispiel 1,4-Diamino-benzol (p-Phenylendiamin), 1,4-Diamino-2-methyl-benzol (p-Toluyldiamin), 1,4-Diamino-2,6-dimethyl-benzol, 1,4-Diamino-2,5-dimethyl-benzol, 1,4-Diamino-2,3-dimethyl-benzol, 2-Chlor-1,4-diamino-benzol, 4-Phenylamino-anilin, 4-Dimethylamino-anilin, 4-Diethylamino-anilin, 4-[Di(2-hydroxyethyl)amino]-anilin, 4-[(2-Methoxyethyl)amino]-anilin, 4-[(3-Hydroxypropyl)amino]-anilin, 1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol, 1,4-Diamino-2-(1-methylethyl)-benzol, 1,3-Bis[(4-aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol, 1,8-Bis(2,5-diaminophenoxy)-3,6-dioxaoctan, 4-Amino-phenol, 4-Amino-3-methylphenol, 4-Methylamino-phenol, 4-Amino-2-(aminomethyl)-phenol, 4-Amino-2-[(2-hydroxyethyl)-amino]methyl-phenol, 4-Amino-2-(methoxymethyl)-phenol, 4-Amino-2-(2-hydroxyethyl)-phenol, 5-Amino-salicylsäure, 2,5-Diamino-pyridin, 2,4,5,6-Tetraamino-pyrimidin, 2,5,6-Triamino-4-(1H)-pyrimidin, 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol, 4,5-Diamino-1-(1-methyl-ethyl)-1H-pyrazol, 4,5-Diamino-1-[(4-methyl-phenyl)methyl]-1H-pyrazol, 1-[(4-Chlorphenyl)methyl]-4,5-diamino-1H-pyrazol, 4,5-Diamino-1-methyl-1H-pyrazol, 2-Amino-phenol, 2-Amino-6-methyl-phenol oder 2-Amino-5-methyl-phenol; sowie m-Phenylendiamin-Derivate, m-Aminophenol-Derivate, Pyridine, Naphthole, Naphthaline, Indole, 3,4-Methylenedioxy-benzole, Benzoxazine und Indolindione, wie zum Beispiel N-(3-Dimethylamino-phenyl)-harnstoff, 2,6-Diamino-pyridin, 2-Amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino]-anisol, 2,4-Diamino-1-fluor-5-methylbenzol, 2,4-Diamino-1-methoxy-5-methyl-benzol, 2,4-Diamino-1-ethoxy-5-methyl-benzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)-5-methyl-benzol, 2,4-Di[(2-hydroxyethyl)amino]-1,5-dimethoxy-benzol, 2,3-Diamino-6-methoxy-pyridin, 3-Amino-6-methoxy-2-(methylamino)-pyridin, 2,6-Diamino-3,5-dimethoxy-pyridin, 3,5-Diamino-2,6-dimethoxy-pyridin, 1,3-Diamino-benzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxy-ethoxy)-benzol, 1-(2-Aminoethoxy)-2,4-diamino-benzol, 2-Amino-1-(2-hydroxyethoxy)-4-methylamino-benzol, 2,4-Diaminophenoxy-essigsäure, 3-[Di(2-hydroxyethyl)amino]-anilin, 4-Amino-2-di[(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethoxy-benzol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)-amino]-anilin, 3-[(2-Aminoethyl)amino]-anilin, 1,3-Di(2,4-diaminophenoxy)-propan, Di(2,4-diaminophenoxy)-methan, 1,3-Diamino-2,4-dimethoxy-benzol, 2,6-Bis(2-hydroxyethyl)amino-toluol, 4-Hydroxyindol, 3-Dimethylaminophenol, 3-Diethylamino-phenol, 5-Amino-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-fluor-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-methoxy-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-ethoxy-2-methyl-phenol, 3-Amino-2,4-dichlor-phenol, 5-Amino-2,4-dichlor-phenol, 3-Amino-2-methyl-phenol, 3-Amino-2-chlor-6-methylphenol, 3-Amino-phenol, 2-[(3-Hydroxyphenyl)amino]-acetamid, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-phenol, 3-[(2-Methoxyethyl)amino]-phenol, 5-Amino-2-ethyl-phenol, 2-(4-Amino-2-hydroxyphenoxy)-ethanol, 5-[(3-Hydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2,3-Dihydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 2-Amino-3-hydroxy-pyridin, 5-Amino-4-chlor-2-methyl-phenol, 1-Naphthol, 1,5-Dihydroxy-naphthalin, 1,7-Dihydroxy-naphthalin, 2,3-Dihydroxy-naphthalin, 2,7-Dihydroxynaphthalin, 2-Methyl-1-naphthol-acetat, 1,3-Dihydroxy-benzol, 1-Chlor-2,4-dihydroxy-benzol, 2-Chlor-1,3-dihydroxy-benzol, 1,2-Dichlor-3,5-dihydroxy-4-methyl-benzol, 1,5-Dichlor-2,4-dihydroxy-benzol, 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol, 3,4-Methylenedioxy-phenol, 3,4-Methylenedioxy-anilin, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1,3-benzodioxol, 6-Brom-1-hydroxy-3,4-methylenedioxy-benzol, 3,4-Diamino-benzoesäure, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-1,4(2H)-benzoxazin, 6-Amino-3,4-dihydro-1,4(2H)-benzoxazin, 5,6-Dihydroxy-indol, 5,6-Dihydroxy-indolin, 5-Hydroxy-indol, 6-Hydroxy-indol, 7-Hydroxy-indol oder 2,3-Indolindion, zu nennen.

[0013] Das erfindungsgemäße Mittel ist zwar grundsätzlich sowohl zum Färben von natürlichen Fasern, wie zum Beispiel keratinischen Fasern wie Wolle, Baumwolle, Jute, Sisal, Leinen, Seide und Haaren, als auch von modifizierten Naturfasern, wie zum Beispiel Regeneratcellulose, Nitrocellulose, Alkylcellulose oder Hydroxyalkylcellulose oder Acetylcellulose, und synthetische Fasern, wie zum Beispiel Polyamidfasern, Polyurethanfasern oder Polyesterfasern geeignet; besonders bevorzugt ist jedoch die Verwendung des erfindungsgemäßen Färbemittels zur Färbung von Keratinfasern und insbesondere menschlichen Haaren.



gestoffe in einer Menge von etwa 0,1 bis 5 Gewichtsprozent.

[0020] Das vorstehend beschriebene Färbemittel ohne Oxidationsmittelzugabe kann weiterhin für kosmetische Mittel übliche natürliche oder synthetische Polymere beziehungsweise modifizierte Polymere natürlichen Ursprungs enthalten, wodurch gleichzeitig mit der Färbung eine Festigung der Haare erreicht wird. Solche Mittel werden im allgemeinen als Farbfestiger bezeichnet. Von den für diesen Zweck in der Kosmetik bekannten synthetischen Polymeren seien beispielsweise Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol oder Polyacrylverbindungen wie Polyacrylsäure oder Polymethacrylsäure, basische Polymerisate von Estern der Polyacrylsäure, Polymethylacrylsäure und Aminoalkoholen sowie deren Salze oder Quaternisierungsprodukte, Polyacrylnitril, Polyvinylacetate sowie Copolymerisate aus derartigen Verbindungen, wie zum Beispiel Polyvinylpyrrolidon-Vinylacetat, genannt; während als natürliche Polymere oder modifizierte natürliche Polymere beispielsweise Chitosan (deacetyliertes Chitin) oder Chitosanderivate, eingesetzt werden können. Die vorgenannten Polymere können in dem erfindungsgemäßen Mittel in den für solche Mittel üblichen Mengen, insbesondere in einer Menge von etwa 1 bis 5 Gewichtsprozent, enthalten.

[0021] Der pH-Wert des erfindungsgemäßen Färbemittels mit zusätzlicher Festigung beträgt vorzugsweise etwa 3,0 bis 9,0.

[0022] Wird das erfindungsgemäße Färbemittel in Kombination mit einem Oxidationsmittel verwendet, so werden als Oxidationsmittel vorzugsweise Wasserstoffperoxid oder dessen Additionsverbindungen eingesetzt, wobei im Falle einer 3-bis 12prozentigen wäßrigen Wasserstoffperoxidlösung das Färbemittel mit dem Oxidationsmittel vorzugsweise in einem Gewichtsverhältnis von 1:1 bis 1:6 vermischt wird.

[0023] Das erfindungsgemäße Färbemittel wird in üblicher Weise angewendet, indem man die Komponenten des Färbemittels vor der Behandlung erforderlichenfalls miteinander vermischt und eine zur Färbung der Faser (beispielsweise menschlichen Haaren) ausreichende Menge des Färbemittels, im allgemeinen etwa 50 bis 150 Gramm, auf die Faser aufträgt. Nach einer für die Färbung ausreichenden Einwirkungszeit, die üblicherweise etwa 10 bis 30 Minuten beträgt, wird die Faser mit Wasser gespült, gegebenenfalls mit einem Shampoo gewaschen und/oder mit einer wäßrigen Lösung einer schwachen organischen Säure, wie zum Beispiel Zitronensäure oder Weinsäure, nachgespült, und sodann getrocknet. Im Falle des Färbemittels mit zusätzlicher Festigung erfolgt die Anwendung jedoch in bekannter und üblicher Weise durch Befeuchten der Faser mit dem Färbemittel, Festlegen (Einfegen) des Haares zur Frisur und anschließende Trocknung.

[0024] Hinsichtlich der färberischen Möglichkeiten bietet das erfindungsgemäße Färbemittel je nach Art und Zusammensetzung eine breite Palette verschiedener Farbnuancen, die sich von natürlichen Farbtönen bis hin zu hochmodischen, leuchtenden Nuancen erstreckt.

[0025] Die nachstehenden Beispiele sollen den Erfindungsgegenstand näher erläutern, ohne ihn auf die angeführten Beispiele zu beschränken.

Beispiele

Beispiele 1-12: 2-Komponenten-Haarfärbemittel (sauer)

Komponente 1:

[0026]

10,0 g	Ethanol
0,1 g	Natriumlauryl ethersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
10 mmol	1,3-Indandion
ad 50,0 g	Wasser vollentsalzt

Komponente 2:

[0027]

10,0g	Ethanol
10 mmol	Amin gemäß Tabelle 1
ad 50,0 g	Wasser, vollentsalzt

[0028] Die beiden Komponenten werden unmittelbar vor der Anwendung zu einem Färbemittel mit pH=5,5 vermischt, welches auf gebleichtes Haar aufgetragen wird. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C werden die Haare mit Wasser gespült, shampooiert und getrocknet.

[0029] Das erhaltene Färbeergebnis ist in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
1	p-Phenylendiamin	rotbraun	sehr stark
2	1,4-Diamino-2-methylbenzol	braun	stark
3	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	mittelblond	mittel
4	4-Amino-phenol	rotbraun	mittel
5	4-Amino-3-methyl-phenol	mittelbraun	mittel
6	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin	mittelblond	mittel
7	4-Amino-2-(aminomethyl)phenol	braunorange	mittel
8	4-Diethylamino-anilin	rotviolett	sehr stark
9	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl]amino]-anisol	kupferrot	sehr stark
10	5-Amino-2-methylphenol	kupferorange	sehr stark
11	3-Aminophenol	rotviolett	mittel
12	4,5-Diamino-1-isopropylpyrazol	kupfer	stark

Beispiele 13-23: Haarfärbelösungen (sauer)

[0030] Unmittelbar vor der Anwendung wird die folgende Färbelösung hergestellt:

20,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumaurylathersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 10 mmol 1,3-Indandion
 20 mmol Amin gemäß Tabelle 2
 ad 100,0 g Wasser vollentsalzt

[0031] Der pH-Wert der Färbemittel wird jeweils auf 5,5 eingestellt.

Das Färbemittel wird auf gebleichtes Haar aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C mit Wasser ausgespült.

Anschließend wird das Haar shampooiert und getrocknet.

[0032] Das erhaltene Färbergebnis ist in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
13	p-Phenylendiamin	braunschwarz	sehr stark
14	1,4-Diamino-2-methylbenzol	dunkelbraun	stark
15	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	hellbraun	stark
16	4-Amino-phenol	rotbraun	stark
17	4-Amino-3-methyl-phenol	mittelbraun	mittel
18	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin	mittelblond	mittel
19	4-Amino-2-(aminomethyl)phenol	braun	mittel
20	4-Diethylamino-anilin	aubergine	sehr stark
21	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl]-amino]-anisol	kupferrot	sehr stark
22	5-Amino-2-methylphenol	braun	sehr stark

EP 1 010 419 A2

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
23	3-Aminophenol	rehbraun	stark

Beispiele 24-29: 2-Komponenten-Haarfärbemittel (sauer)

Komponente 1:

[0033]

10,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumlauryl ethersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 10 mmol 5-Methoxy-1,3-indandion
 ad 50,0 g Wasser vollentsalzt

Komponente 2:

[0034]

10,0g Ethanol
 10 mmol Amin gemäß Tabelle 3
 ad 50,0 g Wasser vollentsalzt

[0035] Die beiden Komponenten werden unmittelbar vor der Anwendung zu einem Färbemittel mit pH=5,5 vermischt, welches auf gebleichtes Haar aufgetragen wird. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C werden die Haare mit Wasser gespült, shampooiert und getrocknet. Das erhaltene Färbeergebnis ist in Tabelle 3 zusammengefaßt.

Tabelle 3

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
24	p-Phenylendiamin	mittelbraun	stark
25	1,4-Diamino-2-methylbenzol	braun	mittel-stark
26	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	braun	mittel-stark
27	3-Aminophenol	stumpf braun	mittel
28	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl]amino]-anisol	schwarzbraun	sehr stark
29	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol	kastanie	stark

Beispiele 30 - 38: Haarfärbelösungen (sauer)

[0036] Unmittelbar vor der Anwendung wird die folgende Färbelösung hergestellt:

20,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumlauryl ethersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 10 mmol 5,6-Dichlor-1,3-indandion
 10 mmol Amin gemäß Tabelle 4
 ad 100,0 g Wasser vollentsalzt

[0037] Der pH-Wert der Färbemittel wird jeweils auf 5,5 eingestellt.

[0038] Das Färbemittel wird auf gebleichtes Haar aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C mit Wasser ausgespült.

Anschließend wird das Haar shampooiert und getrocknet.

[0039] Das erhaltene Färbeergebnis ist in Tabelle 4 zusammengefaßt.

Tabelle 4

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
30	2,5-Diaminotoluol	dunkelbraun	sehr stark
31	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	braun	mittel-stark
32	4-Amino-phenol	rotbraun	stark
33	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol	kupfer	mittel
34	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin	blond	mittel
35	4-Diethylamino-anilin	dunkelbraun	stark
36	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl)-amino]-anisol	dunkelbraun	stark
37	5-Amino-2-methylphenol	gelbl. braun	stark
38	3-Aminophenol	aubergine	mittel

Beispiele 39 - 47: 2-Komponenten-Haarfärbemittel (sauer)

Komponente 1:

[0040]

10,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumlaurylathersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 10 mmol 4,5,6,7-Tetrachlor-1,3-indandion
 ad 50,0 g Wasser vollentsalzt

Komponente 2:

[0041]

10,0g Ethanol
 10 mmol Amin gemäß Tabelle 5
 ad 50,0 g Wasser vollentsalzt

[0042] Die beiden Komponenten werden unmittelbar vor der Anwendung zu einem Färbemittel mit pH=5,5 vermischt, welches auf gebleichtes Haar aufgetragen wird. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C werden die Haare mit Wasser gespült, shampooiert und getrocknet. Das erhaltene Färbeergebnis ist in Tabelle 5 zusammengefaßt.

Tabelle 5

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
39	1,4-Diamino-2-methylbenzol	braun	stark
40	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	braun	mittel-stark
41	4-Amino-phenol	mittelblond	mittel-stark
42	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol	rot	stark
43	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin	goldgelb	stark
44	4-Diethylamino-anilin	rehbraun	mittel-stark
45	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl)-amino]-anisol	graubraun	mittel-stark
46	5-Amino-2-methylphenol	ocker	sehr stark

Tabelle 5 (fortgesetzt)

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
47	3-Aminophenol	orange-gelb	mittel

Beispiele 48 - 56: Haarfärbelösungen (sauer)

[0043] Unmittelbar vor der Anwendung wird die folgende Färbelösung hergestellt:

20,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumaurylathersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 10 mmol 4-Nitro-1,3-indandion
 10 mmol Amin gemäß Tabelle 6
 ad 100,0 g Wasser vollentsalzt

[0044] Der pH-Wert der Färbemittel wird jeweils auf 5,5 eingestellt.
 Das Färbemittel wird auf gebleichtes Haar aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C mit Wasser ausgespült.

Anschließend wird das Haar shampooiert und getrocknet.

[0045] Das erhaltene Färbeergebnis ist in Tabelle 6 zusammengefaßt.

Tabelle 6

Beispiel Nr.	Amin	Nuance	Intensität
48	2,5-Diaminotoluol	schwarz, violetter Reflex	sehr stark
49	1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol	schwarz, violetter Reflex	sehr stark
50	4-Amino-phenol	schwarz, rotvioletter Reflex	sehr stark
51	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol	schwarz, roter Reflex	sehr stark
52	2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin	schwarz, metallischer Glanz	sehr stark
53	4-Diethylamino-anilin	schwarz, violetter Reflex	sehr stark
54	2-Amino-4-[2-hydroxyethyl]-amino]-anisol	schwarz, rotvioletter Reflex	sehr stark
55	5-Amino-2-methylphenol	schwarz, violetter Reflex	sehr stark
56	3-Aminophenol	schwarz, violetter Reflex	sehr stark

Beispiel 57: Haarfärbelösung (neutral)

[0046] Unmittelbar vor der Anwendung wird die folgende Färbelösung hergestellt:

20,0 g Ethanol
 0,1 g Natriumaurylathersulfat (28-prozentige wäßrige Lösung)
 0,5 g 1,3-Indandion
 0,7 g 5,6-Dichlor-1,3-indandion
 0,9 g 4,5,6,7-Tetrachlor-1,3-indandion
 1,3 g 1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)-benzol-sulfat
 1,2 g 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol-sulfat
 ad 100,0 g Wasser vollentsalzt

[0047] Der pH-Wert des Färbemittels wird auf 7,0 eingestellt.
 Das Färbemittel wird auf gebleichtes Haar aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °C mit Wasser ausgespült.

Anschließend wird das Haar shampooiert und getrocknet.


Die Haare sind modisch rotbraun gefärbt.

[0048] Alle Prozentangaben stellen, soweit nicht anders angegeben, Gewichtsprocente dar.

Patentansprüche

1. Mittel zum Färben von Fasern, dadurch gekennzeichnet, daß es

- (a) mindestens ein 1,3-Indandion der allgemeinen Formel (I) und
(b) mindestens ein aromatisches Amin enthält,



wobei die Reste R₁, R₂, R₃ und R₄ untereinander gleich oder verschieden sein können und die folgende Bedeutung haben:

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Acetylaminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Acetoxygruppe, eine Methylgruppe oder Ethylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, eine Benzyloxygruppe, die gegebenenfalls durch eine Methylgruppe, eine Methoxygruppe oder ein Halogenatom substituiert sein kann, ein über eine Etherbrücke verknüpfter C2- bis C8-Mono-Olefinrest oder Di-Olefinrest, ein 1,3-Indandion-5-yl-Rest, eine Phenylgruppe, eine Carbonsäuregruppe, eine Carbamidgruppe, eine C1- bis C7-Carbonsäureestergruppe oder eine Phenoxypropoxygruppe; R₁ und R₂ beziehungsweise R₂ und R₃ gemeinsam eine C5- bis C6-Alkylengruppe, eine 1,3-Dioxolbrücke, eine 1,4-Dioxinbrücke, ein gegebenenfalls mit einem Halogenatom, einer Hydroxygruppe, einer Methoxygruppe oder einer Ethoxygruppe substituiertes ankondensiertes benzoaromatisches System oder ein ankondensiertes naphthoaromatisches System bilden; oder R₂ und R₃ gemeinsam eine 1,3-Dioxo-propan-1,3-diyl-Gruppe bilden.

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) die Reste R₁, R₂, R₃ und R₄ unabhängig voneinander die folgende Bedeutung haben: Wasserstoff, ein Halogenatom, eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Methylgruppe, eine geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppe mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, eine Benzyloxygruppe, die gegebenenfalls durch eine Methylgruppe oder eine Methoxygruppe substituiert sein kann oder eine Carbamidgruppe; R₁ und R₂ beziehungsweise R₂ und R₃ gemeinsam eine 1,3-Dioxolbrücke oder eine 1,4-Dioxinbrücke bilden.
3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der Formel (I) ausgewählt ist aus 1,3-Indandion, 4-Nitro-1,3-indandion, 5-Nitro-1,3-indandion, 5,6-Dichlor-1,3-Indandion und 4,5,6,7-Tetrachlor-1,3-Indandion.
4. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das aromatische Amin ausgewählt ist aus p-Phenylendiamin-Derivaten, p-Aminophenol-Derivaten, Pyridinen, Pyrimidinen, Pyrimidonen, Pyrazolen, m-Phenylendiamin-Derivaten, m-Aminophenol-Derivaten, Naphtholen, Naphthalinen, Indolen, 3,4-Methylenedioxy-benzolen, Benzoxazinen und Indolindionen.
5. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es die Verbindung der Formel (I) und das aromatische Amin jeweils in einer Menge von 0,01 bis 5 Gewichtsprozent enthält.
6. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es einen pH-Wert von 3 bis 12 aufweist.
7. Verfahren zum Färben von Fasern, dadurch gekennzeichnet, daß man eine zur Färbung der Faser ausreichende Menge eines Färbemittels nach einem der Ansprüche 1 bis 6 auf die Faser aufträgt, nach einer Einwirkungszeit von 10 bis 30 Minuten die Faser mit Wasser spült, gegebenenfalls mit einem Shampoo wäscht und/oder mit einer wäßrigen Lösung einer schwachen organischen Säure nachspült und sodann trocknet.